

Πρωτόκολλα ΝΕΙΜ, ΓΟΝΚ «ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ»
Εφαρμογή από Αύγουστο 2017 έως

ΕΓΓΡΑΦΟ:2

ΤΙΤΛΟΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ: ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΟΞΕΙΑΣ ΑΙΜΟΛΥΤΙΚΗΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΗΣ

1. **Αποφυγή άλλης μετάγγισης** μέχρι το τέλος της εργαστηριακής διερεύνησης
2. **Διατήρηση γραμμής** μόνο με ορό Ν/Σ 0.9%
3. **Χορήγηση υγρών:** 3000 ml Ν/Σ 0.9%/24ωρο
4. **Διούρηση:**
 - στόχος > 150 ml/ώρα
 - φουροσεμίδη (**Lasix**) : 20-80 mg bolus iv
 - **μανιτόλη** (διάλυμα 20%):100 ml εντός 30-60 λεπτών και στη συνέχεια 20 ml/ώρα για 6-12 ώρες
 - **ντοπαμίνη** σε διουρητική δόση: 1-3 μg/kg/λεπτό για 6-12 ώρες
5. **Διττανθρακικά** (sodium bicarbonate) σε ανώτερη δόση 100 ml x 3, με στόχο pH ούρων >7
6. **Άμεση λήψη εργαστηριακών εξετάσεων:**
 - ομάδα αίματος και ΔΕΚ (φιαλ. με μωβ πώμα)
 - ΡΤ, ΑΡΤΤ, ΙΝΩΔΟΓΟΝΟ, D-DIMERS (φιαλ. με μπλε πώμα)
 - ΒΙΛ.Τ/ΙΝΔ., LDH, απτοσφαιρίνη (φιαλ.με κόκκινο πώμα=πήγμα)
 - αιμοκαλλέργεια για αερόβια, αναερόβια
 - γενική ούρων
7. Σε συνεννόηση με τον ιατρό της Αιμοδοσίας προληπτική χορήγηση 1gr Methylprednisolone IV (+/- IVIG) SHOT 2015 Bite-8

Σε περίπτωση ΔΕΠ:

- φρέσκο κατεψυγμένο πλάσμα (**FFP**), αναλόγως των τιμών ΡΤ, ΑΡΤΤ
- **αιμοπετάλια**, αναλόγως της τιμής τους (συνήθως <30.000/μL)
- **monitoring** του καρδιακού ρυθμού λόγω κινδύνου σοβαρών αρρυθμιών από πιθανή υπερκαλιαιμία
- **αιμοδιάλυση** σε περίπτωση οξείας νεφρικής ανεπάρκειας
- ο ασκός του παραγώγου επιτρέφεται στην αιμοδοσία

ΔΙΣΚΟΣ ΜΕ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΥΛΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΣΟΒΑΡΩΝ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΩΝ ΜΕΤΑΓΓΙΣΗΣ:

1. φλεβοκαθετήρες (ροζ, πράσινοι, μπλε)
2. αυτοκόλλητα σταθεροποίησης καθετήρων
3. ρινική κάνουλα
4. μάσκα Venturi
5. στοματοφαρυγγικός αεραγωγός
6. γλωσσοπίεστο
7. ενδοτραχειακός αγωγός Ν.8
8. ορός Ν/Σ 0,9%
9. συσκευή ορού
10. φάρμακα: Lasix, μανιτόλη, dopamine, sodium bicarbonate, fenistil, solu-cortef, paracetamol

Εκ της Νοσοκομειακής Επιτροπής Ιατρικής των Μεταγίσεων
ΓΟΝΚ «ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ»